

PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA BIOPSIA PROSTATICA

Si consiglia che la persona sottoposta alla prestazione venga accompagnato da una persona e che non debba tornare a casa guidando mezzi di trasporto in quanto le biopsie prostatiche vengono effettuate in anestesia locale.

ATTENZIONE!

In caso di terapia antiaggregante / anticoagulante in atto, a causa dell'alto rischio di sanguinamento durante e dopo l'esame, sospendere almeno **7 - 10 giorni** prima l'eventuale terapia antiaggregante (esempio: *Aspirina, Aspirinetta, Cardioaspirina, Tiklid, Cardirene, Antigreg, Plavix, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Clox, Opteron*) e per almeno **5 giorni** dopo la biopsia. Altri farmaci che abitualmente si usano (antipertensivi, gastroprotettori, ipoglicemizzanti) devono essere comunque assunti prima e dopo l'esame.

In caso di duplice terapia antiaggregante/coagulante orale, presenza di stents coronarici o gravi cardiopatie, **contattare il cardiologo con il quale si è in cura** per valutare la sospensione o la sostituzione del/dei farmaco/i con eparina a basso peso molecolare **e chiamare il Personale dell'Ambulatorio di Urologia** al numero:

02 6951 7473 oppure 02 6951 6540

per le indicazioni del caso.

Prima dell'esame:

↳ Eseguire i seguenti esami ematochimici (*validità degli esami non oltre 1 mese*):

- ✓ **Esame Emocromocitometrico,**
- ✓ **Pt e PTT,**
- ✓ **Esame urine + urinocoltura + antibiogramma**

e portarli al momento dell'esame (*i risultati devono essere normali per poter effettuare l'esame*).

↳ Iniziare terapia orale con **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno**, da **2 giorni prima** dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame e poi per **altri 5 giorni** dopo la biopsia.

Se il paziente:

- è **allergico** a farmaci chinolonici
- pratica **attività sportiva** (a causa di effetti collaterali al tendine achilleo)
- è a rischio o è portatore di **aneurismi aortici o dissezione aortica** (*sindrome di Marfan, sindrome vascolare di Ehlers-Danlos, arterite di Takayasu, arterite a cellule giganti, malattia di Behçet, aterosclerosi grave*)

si consiglia di **non assumere Levofloxacin** ma eseguire la preparazione con:

Sulfametoxazolo + Trimetoprim prendere **1 compressa 2 volte al giorno** (mattina e sera), da **2 giorni prima** dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame e poi per **altri 5 giorni** dopo la biopsia.

Eseguire un clistere (Clisma Lax) la sera prima dell'esame e la mattina stessa

INDICAZIONI PER PAZIENTI CHE DEVONO SOTTOPORSI A PROFILASSI PER ENDOCARDITE BATTERICA

Iniziare terapia orale, da **2 giorni prima** dell'esame con **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno**.

Se il paziente è *allergico a farmaci chinolonici*, si consiglia eseguire la preparazione con:

Sulfametoxazolo+Trimetoprim prendere **1 compressa 2 volte al giorno** (mattina e sera), da **2 giorni prima** dell'esame.

Il giorno stesso dell'esame, **1 ora prima dell'inizio della procedura**, assumere **Ampicillina 2 grammi per bocca e Gentamicina 160 mg in muscolo** (in caso di allergia a penicillina verrà somministrata **Dalacin 600 mg compresse**).

Proseguire per **altri 5 giorni** dopo la biopsia con: **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno** (valutando le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali sopra indicati) o con **Sulfametoxazolo+Trimetoprim** prendere **1 compressa 2 volte al giorno** (mattina e sera)

INDICAZIONI PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV O IN TERAPIA IMMUNOSOPRESSIVA

Essendo la biopsia prostatica un esame ad alto rischio di infezioni batteriche locali e sistemiche è indispensabile una **relazione del Medico Curante** (infettivologo o immunologo) che attesti lo stato immunitario del paziente, il rischio infettivo della manovra, gli esami eventualmente utili (oltre all'urinocoltura) per evitare infezioni e la terapia antibiotica consigliata per il paziente.

IMPORTANTE

I pazienti che devono eseguire una BIOPSIA PROSTATICA con il **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**, sono pregati di presentarsi agli sportelli dell'accettazione ambulatorio il giorno dell'appuntamento con **due impegnative per:**

1. "Biopsia prostatica ecoguidata", esplicitando anche la motivazione all'esame (*quesito diagnostico*)
2. "Esame istologico di biopsia prostatica", esplicitando anche il *quesito diagnostico*

Per i pazienti con **assicurazione o privati** non serve alcuna impegnativa (a meno che non venga espressamente richiesta dall'ente assicurativo).

IL GIORNO DELL'ESAME

Eeguire un clistere (esempio Clisma Lax) la sera prima dell'esame e la mattina stessa.

✓ *Si ricordi di portare con se:*

↳ **Impegnative del Medico di Medicina Generale (se necessarie)**

↳ **Documentazione urologica ed esami eseguiti** (a esempio precedenti ecografie o biopsie, esami del sangue, lettere di dimissione)

↳ **Nota informativa consegnata / ricevuta** (scaricabile dal sito <http://www.sanpiox.net/>)

↳ **Elenco dei farmaci assunti quotidianamente**

✓ Presentarsi all'esame avendo assunto i farmaci abituali (**eccetto gli antiaggreganti piastrinici**), avendo bevuto liquidi e avendo fatto colazione o un **pranzo leggero. Non presentarsi a digiuno.**

✓ **Informare** il personale sanitario di eventuali **allergie a farmaci** (specialmente ad anestetici locali e delle terapie in corso).

In caso di mancata mancata preparazione antibiotica, mancata sospensione di antiaggreganti o mancanza di esami o di impegnative mediche, esami alterati (diminuita coagulazione o urinocoltura positiva) o di mancanza di documentazione clinica urologica pregressa, firma del consenso informato **l'esame non sarà eseguito.**

Si prega cortesemente di segnalare eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione dell'esame, telefonando al numero 02 6951 7801