

PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA INSTILLAZIONI VESCICALI

Si consiglia che la persona sottoposta alla prestazione venga accompagnato da una persona e che non debba tornare a casa guidando mezzi di trasporto.

In caso di donne fertili occorre eseguire test di gravidanza che **deve risultare negativo** poiché gravidanza ed allattamento controindicano l'esecuzione di instillazioni endovesicali.

In caso di instillazioni con BCG il farmaco può creare eventuali infiammazioni a livello dell'apparato genito-urinario può dare una diminuzione della fertilità.

Prima dell'esame:

↳ Eseguire i seguenti esami:

- In caso di **instillazione con Farmorubicina o Mitomicina** eseguire
 - ✓ **Esame urine + urinocoltura + antibiogramma**
 - ✓ **Test di gravidanza** (in caso di donna fertile, deve risultare negativo)
- In caso di **instillazione con BCG** eseguire:
 - ✓ **Test Tine/ Mantoux o Quantiferon o Elispot**
 - ✓ **Rx torace**
 - ✓ **Visita pneumologia**
- In caso dei **tre richiami settimanali con BCG**:
 - se il/la paziente non ha avuto problemi durante il ciclo non occorre eseguire ulteriori esami.
 - se durante il **primo ciclo** ci sono stati **problemi di infezioni con febbre** si consiglia, prima di sottoporsi al richiamo settimanale, di eseguire: **RX torace e visita pneumologia**

↳ Iniziare terapia orale con **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno, da 2 giorni prima** dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame e poi per **altri 5 giorni** dopo la biopsia.

Se il/la Paziente :

- ✓ è **allergico** a farmaci chinolonici
- ✓ pratica **attività sportiva** (a causa di effetti collaterali al tendine achilleo)
- ✓ è a rischio o è portatore di **aneurismi aortici o dissezione aortica** (*sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, arterite di Takayasu, arterite a cellule giganti, malattia di Behçet, aterosclerosi grave*)
- ✓ si consiglia di **non assumere Levofloxacin** ma eseguire la preparazione con **Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno** (mattina e sera), dal giorno prima dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame ed il giorno dopo.

Se sottoposto ad instillazioni **con BCG**: si consiglia di avere a disposizione, per eventuale febbre post instillazione, farmaci antitubercolari (**Nicozid** da assumere in dosi da 1+1 compressa/giorno)

PAZIENTI CHE DEVONO SOTTOPORSI A PROFILASSI PER ENDOCARDITE BATTERICA

Iniziare terapia orale, da **2 giorni prima** dell'esame con: **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno** (valutando le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali sopra indicati) o con

Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno (mattina e sera).

Il giorno stesso dell'esame, **1 ora prima dell'inizio della procedura**, assumere:

- **Ampicillina 2 grammi per bocca e Gentamicina 160 mg in muscolo** (in caso di allergia a penicillina verrà somministrata **Clindamicina 600 mg compresse**).

Proseguire per **altri 5 giorni** dopo la biopsia con **Levofloxacin 500 mg, 1 compressa al giorno** (valutando le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali sopra indicati) o con

Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno (mattina e sera).

INDICAZIONI PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV O IN TERAPIA IMMUNOSOPRESSIVA

Essendo la manovra della cateterizzazione per eseguire l'instillazione un esame a rischio di infezioni batteriche locali e sistemiche, è indispensabile una **relazione del medico curante** (infettivologo o immunologo) che attesti lo stato immunitario del paziente, il rischio infettivo della manovra, gli esami eventualmente utili (oltre all'urinocoltura) per evitare infezioni e la terapia antibiotica consigliata.

IMPORTANTE

I pazienti che devono eseguire l'INSTILLAZIONE ENDOVESICALE con il **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**, sono pregati di presentarsi agli sportelli dell'accettazione ambulatorio il giorno dell'appuntamento con **una impegnativa per**

1. "Ciclo di instillazioni endovesicali" (*codice regionale 5794*), con i successivi appuntamenti settimanali o mensili esplicitando anche la motivazione (*quesito diagnostico*)

Per i pazienti **con assicurazione o privati** non serve alcuna impegnativa (a meno che non venga espressamente richiesta dall'ente assicurativo)

IL GIORNO DELL'ESAME

✓ *Si ricordi di portare con se:*

✎ **Impegnative del Medico di Medicina Generale** (*se necessarie*)

✎ **Documentazione urologica ed esami eseguiti** (*esempio* precedenti tomografie computerizzate (TC), cistoscopie, ecografie o biopsie, esami del sangue, lettere di dimissione ospedaliera)

✎ **Documentazione sanitaria riguardante la patologia per la quale si esegue l'instillazione ed esami eseguiti** (*esempio* Esame urine + urinocoltura + antibiogramma, visita pneumologo, test per tbc, Rx torace, test di gravidanza)

✎ **Nota informativa consegnata / ricevuta** (scaricabile dal sito <http://www.sanpiox.net/>)

✎ **Elenco dei farmaci assunti quotidianamente**

✓ Presentarsi all'esame a **vescica vuota** ed avendo **assunto i farmaci abituali, bevuto liquidi e fatto colazione** o un **pranzo leggero. Non presentarsi a digiuno!**

✓ **Informare** il personale sanitario di eventuali **allergie a farmaci** specialmente ad anestetici locali e delle terapie in corso.

L'esame non sarà eseguito in caso di: mancata esecuzione degli esami richiesti e della preparazione antibiotica, urinocoltura positiva, test di gravidanza positivo, assenza di: impegnative mediche, e documentazione clinica specifica

*Si prega cortesemente di segnalare eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione dell'esame, telefonando al numero **02 6951 7801***